Rayos X: Columna Lumbosacra, Dorsolumbar - Sacro Coccix - Abdomen Simple

REQUISITOS Y PREPARACIÓN

Requisitos para el procedimiento:

Mujeres: informar si está en **embarazo o tiene alguna sospecha**.

Si el paciente es **menor de edad debe venir acompañado por un familiar mayor**.

Instrucciones para la preparación:

Dieta líquida el día anterior al examen: consomé, caldo de pollo sin grasa (solo el caldo), té, aromáticas o suero oral. **No tomar lácteos**.

Si la Radiografía es en las horas de la tarde, el paciente debe continuar la dieta líquida hasta seis (6) horas antes de la realización del examen.

El paciente puede tomar cualquiera de las siguientes opciones de laxantes: Travad oral (133 ml) o aceite de ricino (2 onzas). Debe tomar medio frasco a las 4:00 p.m. del día anterior y el otro medio después de la comida entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

Ayuno de comidas durante seis (6) horas. Sin embargo, es recomendable tomar jugos en agua.
No comer chicle ni fumar durante este tiempo.

No suspender los medicamentos de control.

Los pacientes hospitalizados o con urgencia que requieran el examen el mismo día, deben colocarse un enema Travad dos (2) horas antes del examen y hacer dieta líquida después de aplicado.

Instrucciones para la administración de los productos TRAVAD

Antes de iniciar la administración, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

TRAVAD ORAL x 133 ML

Refrigere el frasco de TRAVAD ORAL x 133 mL.

Diluya en 250 mL de agua o jugo de naranja.

Mezcle bien.

Ingiera el contenido en dos tomas, con un intervalo de 10 minutos.

Documentos necesarios para el procedimiento:

- Documento de identidad.
- Orden vigente (no aplica para particulares).
- Resultado de la última Densitometría realizada (sí se ha realizado este examen).
- Exámenes anteriores relacionados con la patología.

Estar media hora (30 minutos) antes del procedimiento

Este espacio será necesario para hacer el registro de su información y confirmar la correcta preparación para la realización de su procedimiento.

ASISTA A TIEMPO

Importante:

* El Travad oral no se puede usar en pacientes con insuficiencia renal, pacientes con megacolon congénito, obstrucción intestinal, insuficiencia cardíaca y desequilibrio electrolítico.

*Todos los pacientes menores de 18 años, el día del examen deben tener un ayuno de cuatro (4) horas, no consumir lácteos, bebidas oscuras ni bebidas gaseosas y no toman laxante, ni aceite de ricino.

*Los pacientes con 60 años en adelante deben hacer dieta líquida el día anterior al examen: consomé, caldo de pollo sin grasa (solo el caldo), té, aromáticas o suero oral, el día del examen tener un ayuno de comidas durante seis (6) horas. No comer chicle ni fumar durante este tiempo. Sin embargo, es recomendable tomar jugos en agua. No toman laxante, ni aceite de ricino.

Importante:

Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional antes o después de ella, por favor comuníquese al teléfono: (604) 444 5690 opción 5.

VIGILADO Supersalud